

### Moderna LP.8.1 COVID-19 疫苗接種方式及上傳 NIS 劑別

年齡	COVID-19 疫苗 接種史	接種方式				接種 劑量	NIS 登錄劑別
		一般		有免疫不全或免疫低下者 <sup>b</sup>			
		接種劑數	與前劑接種間隔	接種劑數	與前劑接種間隔		
滿 6 個月 至 4 歲	未曾接種疫苗	2 劑	4 週以上 <sup>a</sup>	3 劑	第 1-2 劑間隔 4 週以上， 第 2-3 劑間隔 6 個月以上	0.25 mL	1、2、3
	曾接種 COVID-19 疫苗	1 劑	12 週以上 <sup>a</sup>	2 劑	第 1 劑與前劑間隔 12 週以上， 第 1-2 劑間隔 6 個月以上		1、2
滿 5 歲至 11 歲	未曾接種疫苗	1 劑	---	2 劑	第 1 劑與前劑間隔 12 週以上， 第 1-2 劑間隔 6 個月以上	0.25 mL	1、2
	曾接種 COVID-19 疫苗	1 劑	12 週以上	2 劑			
滿 12 歲至 64 歲	未曾接種疫苗	1 劑	---	2 劑			
	曾接種 COVID-19 疫苗	1 劑	12 週以上	2 劑			
65 歲以上 (含 55-64 歲原住民) <sup>b</sup>	未曾接種疫苗	2 劑	第 1-2 劑間隔 6 個月以上	2 劑		0.5 mL	1、2
	曾接種 COVID-19 疫苗	2 劑	第 1 劑與前劑間隔 12 週以上， 第 1-2 劑間隔 6 個月以上	2 劑			

註：

a、4 週= 28 天；12 週= 84 天。

b、自 115 年 4 月 7 日起，65 歲以上長者、55-64 歲原住民及滿 6 個月以上免疫不全或免疫低下者建議再增加接種 1 劑 COVID-19 疫苗，與前 1 劑 COVID-19 疫苗間隔 6 個月(180 天)以上。另考量疫情、個案風險情形(如出國及需緊急治療之健康因素)可以最短間隔(2 個月；60 天)進行接種，提供接種彈性。